




Taxodium distichum var. imbricatum



Højde	12-15 m
Bredde	5-7m
Trækron	narrow conical, half-open crown
Bark og grene	twigs green to reddish brown, bark reddish brown, fibrous grooved
Blad	green
Efterårsfarve	orange, rød
Blomster	inconspicuous, flowers in March
Frugter	green, brown
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	loamy soil, sandy soil, peaty soil, acid soil
Jordfugtighed	Tåler våd jord, modstandsdygtig mod kort oversvømmelse, modstandsdygtig mod længerevarende oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Anvendelse	industriområde
Form	højstammet træ, fjedret træ, højstammet nåltræ, enkeltstående nåltræ

Taxodium distichum var. imbricatum er et løvfældende nåltræ med en bred søjleformet vækstform, senere smalt pyramideformet. Det bliver typisk 12 - 15 m højt. Stammen spidser typisk til i toppen af træet. De unge kviste er rødbrune, den ældre bark er grålig rødbrun og lidt mindre fibrøst afskallet end hos arten T. distichum. Hovedgrenene er mere eller mindre vandrette i forhold til stammen, men sidegrenene vokser opad næsten parallelt med stammen. Nålene er meget små, kun 4 - 6 mm lange, og de er mere eller mindre presset mod kort- og langgrenene. Nålene og de korte skud falder af samtidig om efteråret. Løvet springer ud som lysegrønt og bliver mellemgrønt om sommeren. Efterårsfarven er orangebrun. Den typiske forgrening og fine løvstruktur giver denne sort et slående udseende. Taxodium distichum var. imbricatum tolererer fugtig til våd jord og kan være semi-asfalteret. I modsætning til arten danner denne sort sjældent de karakteristiske knærødder. Finstruktureret sort til brug i haver, parker, industriområder og kirkegårde. Forekommer naturligt i lavere kystområder fra Virginia til Louisiana, USA. Zone for hårdførhed: 6a.