



Acer xfreemanii 'Armstrong'



Højde	10 -15 m
Bredde	4-6m
Trækron	columnar, dark, dense crown
Bark og grene	no particulars
Blad	3/5 lobes, green, 10 -20 cm
Efterårsfarve	orange, rød
Blomster	flower corymbs, red, March/April
Frugter	none, fruitless cultivar
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	not too limy
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	very good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, smalle gader
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Scanlon Nurseries, Ohio, USA, 1951
Synonymer	Acer rubrum 'Armstrong'

Sorten Acer xfreemanii 'Armstrong' opstod i USA i 1951 og blev indtil for nylig regnet som A. rubrum. Nyere undersøgelser har vist, at 'Armstrong' stammer fra en krydsning mellem A. rubrum og A. saccharinum og derfor tilhører hybridén Acer x freemanii. Denne hybrid er ikke kun opstået ved menneskelig aktivitet, men findes også i naturen i USA. Bladene er tre- til femfligede og grønne. Undersiden er grågrøn. I vores land kan den smukke orangerøde efterårsfarve kun ses efter varme somre. Er bredrodet med fin forgrening. 'Armstrong' kræver en jord, der ikke er for kalkholdig. Træet klarer sig godt i brolægning, hvilket gør det ideelt til brug i smalle gader og alléer.