



Acer xzoeschense 'Annae'



Højde	8 - 10 m
Bredde	6-8m
Trækrone	round, spherical, half-open crown
Bark og grene	bark grey-brown, young twigs red
Blad	3/5-lobed, dark green, 5 - 8 cm
Efterårsfarve	orange, rød
Blomster	yellow-green corymbs, May
Frugter	hairy, upright wings, 3 - 5 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	any soils
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Schwerin, Germany, 1908

Acer xzoeschense 'Annae' er en hybrid mellem A. campestre og A. cappadocicum subsp. lobelii. Acer xzoeschense 'Annae' har en åben, næsten kugleformet krone. Træet har en regelmæssig, stokformet vækst og kan nå en højde på ca. 10 m. De unge og slanke kviste, som får tilstrækkeligt med sollys, bliver markant rødbrune. Ældre grene har en gråbrun farve. A. zoeschense 'Annae' danner ikke kork på sine kviste. De blade, der ligner A. campestre, bliver mørklilla og langsomt mørkegrønne. Bladranden er mere bølget end hos A. campestre, og bladene er noget større. En vigtig prydværdi er efterårsfarven på de skinnende mørkegrønne blade i mange nuancer af rød til orange. De ser ofte bedre ud på en solrig plads. Den fine rodvækst er overfladisk. Meget modstandsdygtig over for luftforurening og ufølsom over for sygdomme og skadedyr.