



Acer buergerianum



Højde	12 (-25) meter
Bredde	10-12m
Trækron	ægformet til bred ægformet, ret åben, halvt åben krone
Bark og grene	barken er mørk gråbrun og flager undertiden kraftigt i strimler
Blad	3-fliget, skinnende mørkegrøn, op til 8 cm lang og 2,5 - 6 cm bred
Efterårsfarve	gul, orange, rød
Blomster	cremefarvet, i små, stilkede blomsterstande
Frugter	enkelte frø, vingede, altid parvis. Lysegrøn til rødlig, 2,5 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	veldrænet, let sur til sur jord
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	middelgod/god
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt, bitræ
Anvendelse	trækasser, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Østkina
Synonymer	Acer trifidum

Acer buergerianum er et lille til mellemstort træ, der kan blive mere end dobbelt så stort i naturen som i dyrkning. Først med en smal vifteformet krone, men snart ægformet og senere bredt ægformet. Den mørke gråbrune stamme er undertiden let orange farvet og kan senere i livet skalle af i strimler. Bladet er noget varierende, men har næsten altid tre mere eller mindre fremadrettede flige. Det har givet A. buergerianum navnet Trident Maple. Selvom den nogle gange bruges som gadetræ, er den ideelt set et park- eller solitærtræ. De skinnende mørkegrønne blade har et sundt udseende og kan blive gullige til dybt orangerøde om efteråret. Det varierer dog fra træ til træ og afhænger også af jordtype og lokale klimatiske forhold. Flerårige træer er ret tørkeresistente.