



Acer cappadocicum 'Aureum'



Højde	10 - 15 m
Bredde	6-9m
Trækron	wide, egg-shaped, half-open crown
Bark og grene	young twigs purple-brown, later greyish brown
Blad	from deep purple through bright yellow to yellow-green, 8 - 14 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	yellow green corymbs, 6 - 7 cm, May
Frugter	single-seeded, winged, light green
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	humic, moist soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderate to good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Hesse Baumschulen, Weener, Germany, 1914

Acer cappadocicum 'Aureum' ligner arten meget, når det gælder vækst og vækst, men den største forskel ligger i bladfarven. Når de folder sig ud, er bladene bronzefarvede, inden de hurtigt bliver lysegule. I løbet af sommeren bliver bladene lysegrønne, inden de bliver gule igen om efteråret. Desværre er de unge blade noget modtagelige for forbrænding i solrige perioder i foråret og forsommeren. Træet tåler ikke meget tør jord eller jord med høj pH-værdi. På en placering med let skygge kan 'Aureum' blive til et spektakulært allétræ i brede gader eller som solitær i parker.