



Acer saccharinum



Højde	20 - 25 (35) m, hurtigt voksende
Bredde	14-20m
Trækron	oval til rund, halvåben krone
Bark og grene	grå og glat
Blad	5-fligget, lysegrøn, 10 -15 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	gulgrønne, usynlige klaser, marts
Frugter	vingede nødder, 4 - 5 cm lange
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	både våd og tør jord, tåler hårde overflader
Jordfugtighed	modstandsdygtig mod kort oversvømmelse, modstandsdygtig mod længerevarende oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	moderat til dårlig
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	det centrale og østlige Nordamerika
Synonymer	Acer dasycarpum

Acer saccharinum er et stort, stateligt træ med en bølgende kroneform på grund af de let hængende grene. Det vokser til en betydelig højde med åben forgrening. I sit oprindelige levested i Nordamerika kan man finde eksemplarer på op til 35 m. Det dybt indskårne blad er femfligget til femdelt. Det er grønt med en gråhvid underside. Bladstilken er rød. Om efteråret bliver bladene normalt gule. Med jævne mellemrum bliver nogle blade orange til røde for at skabe et varieret udseende. Blomsten dukker op, før bladet folder sig ud. Det er et lavstammet træ med stærkt forgrenede rødder og mange fine siderødder. Hovedrødderne har en tendens til at skubbe fortovet op. Tåler fugtig jord og er derfor meget anvendelig. Ofte brugt som gadetræ, men på grund af vindinduceret grenbrud er det nu mere almindeligt plantet som parktræ. Acer saccharinum vokser i nærheden af floder og sumpe i sit oprindelsesområde. Træet kan dog også vokse på mere tørre steder.