



Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'



Højde	20 m, fast growing
Bredde	14-16m
Trækron	round to broad fan-shaped, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	grey and smooth
Blad	palmate, lobes very deeply dissected, bright green, 8 - 15 cm, autumn colour yellow
Efterårsfarve	gul
Blomster	green-yellow, inconspicuous, March
Frugter	winged nutlets, 4 - 5 cm long
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	both wet and dry soil, tolerates paved surfaces
Jordfugtighed	modstandsdygtig mod kort oversvømmelse, modstandsdygtig mod længerevarende oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	moderate to poor
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Ellwanger & Barry Nursery, Rochester, NY, USA, 1875
Synonymer	Acer saccharinum var. wieri

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' er et træ med opretstående, løse grene, som efterhånden begynder at hænge bredt ud og skabe en bred, vifteformet krone. Højde og bredde ca. 20 m. Udspilede blade bronzefarvede. Grønne om sommeren med en gråhvid underside, der er lysere end hos arten. Bladene er dybt indskårne og varierer i størrelse. 'Laciniatum Wieri' er bedre kendt end 'Asplenifolium' og adskiller sig ved at have mere spredte blade og mere dybt indskårne flige. Efterårsfarven er gul. Lavtvoksende med stærkt forgrenede rødder og mange fine siderødder. Har tendens til at skubbe brolægning op. Tåler fugtig jord. Ofte brugt som gadetræ, men på grund af vindfremkaldt grenbrud plantes det nu mere som parktræ. Hårdførhedszone: 4