




Acer tataricum subsp. ginnala



Højde	5 - 7 (10) m
Bredde	5-7m
Trækron	vifteformet, halvåben krone
Bark og grene	Stammen er grå, let rillet; unge kviste er rødbrune
Blad	3-fliget, lysegrøn, 4 - 8 cm
Efterårsfarve	orange, rød
Blomster	cremehvid, blomsterkrans, maj/juni
Frugter	vinget, næsten parallel, ca. 2,5 cm lang
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	enhver jord
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	3 (-40,0 til -24,5 °C)
Vindbestandighed	godt
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt, bitræ
Anvendelse	trækasser, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Central- og Nordkina, Japan, Manchuriet
Synonymer	Acer ginnala

Acer tataricum subsp. ginnala vokser normalt til et lille, flerstammet træ. Dens spredte grene skaber i sidste ende et flot solitært træ. På trods af sin ret langsomme vækst kan denne ahorn stadig nå en højde og bredde på over 10 m, når den er fuldt udviklet. I dens naturlige vækstområder i Asien og Rusland forekommer endnu større eksemplarer. Unge og slanke kviste, som får tilstrækkeligt med sollys, bliver rødbrune. Ældre grene har en grå farve. På de treflignede blade er den midterste flig smal og lang. En vigtig prydværdi er efterårsfarven på de skinnende mørkegrønne blade i mange nuancer af rød til orange. I en solrig position ser den ofte bedre ud. Den fine rodvækst er flad og overfladisk. En