



Celtis occidentalis



Højde	8 - 15 (30) m
Bredde	6-12m
Trækron	round, irregular , half-open crown, capricious growing
Bark og grene	grey, irregularly corky-winged
Blad	ovate-lanceolate, green, 7 - 15 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	inconspicuous, green, April/May
Frugter	round stone fruit, purple black, Ø circa 1 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	slightly susceptible
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	central and eastern part of North America

Et træ med en uregelmæssigt voksende kroneform, der er hjemmehørende i Nordamerika. Nogle få steder kan man finde eksemplarer på over 20 m, nogle gange 30 m. Det forgrener sig ret lavt og danner nogle gange et flerstammet træ med mange stærkt hængende kviste. Stammen er takket med dybe indhak og mange buler. Bladene er aflange, ægformede, langspidsede og blankt grønne. Undersiden er mere mat. Den øverste halvdel af bladkanten er skarpt savtakket, og begge sider af bladet føles ru. Om efteråret bliver det påfaldende gyldent. Efter en diskret blomstring kommer der små stenfrugter, som bliver orange til lilla-sort. De kan blive siddende på træet hele vinteren. Træet er værdifuldt, og de unge, bøjelige kviste blev engang brugt som piske.