



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Højde	15 - 20 m
Bredde	8-12m
Trækron	bred ægformet til rund, halvåben krone
Bark og grene	i en moden alder dybt rynket
Blad	ulige-finnet, 9 - 13 småblade, dybgrøn, 15 - 25 cm, fjerformet blad
Efterårsfarve	orange, rød, lilla
Blomster	uanselig gulgrøn, i små buketter, april
Frugter	ingen, frugtløs cultivar
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	ikke for rig i forhold til vækstrate
Jordfugtighed	Tåler tør jord, Tåler våd jord
Krav til vækstedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	ringe i tilfælde af en hurtig vækst
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Australien, 1920
Synonymer	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Sund, men ikke stærkvoksende selektion med en noget uregelmæssig kroneform. F. angustifolia 'Flame' og 'Wollastonii' er identiske med 'Raywood' og kan derfor betragtes som synonymer. Hovedgrenen vokser lige, og stammegrenene er skråtstillede. Barken er grå og dybt rillet senere i livet, og kvistene bliver fra olivengrønne til grågrønne. 'Raywood' har en lukket krone som ungt træ, ældre træer bliver halvåbne. De blanke, dybgrønne blade består af 9-13 smalle småblade. De er ca. 5 - 10 cm lange. Om efteråret bliver bladene orangegule til dybt purpurrøde. På varmere jord og i et varmt efterår er efterårsfarven mere intens. Efter den iøjnefaldende blomstring er der ingen frugtsætning. På frugtbar jord er væksten ofte hurtigere end på dårlig jord. Det kan resultere i grenbrud.