



Ilex x koehneana 'Chestnut Leaf'



Højde	6 - 12 (15) m
Bredde	3-6m
Trækron	pyramidal, dark, dense crown
Bark og grene	twigs bright green, bark green-brown, smooth
Blad	oval to elliptical, glossy dark green, regularly spiked margin, 11 - 16 cm, evergreen
Blomster	unisexual, white, in clusters in the leaf axils, May/June
Frugter	fleshy, round drupe, orange-red
Torne	ingen
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	humic, well-drained soil, tolerates either acidic or calcareous soil
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6 (-23,3 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	very good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, kubusformet, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ
Oprindelse	France
Synonymer	Ilex castaneifolia

Mellemstort til stort træ med en regelmæssig pyramideformet krone. De unge kviste er lysegrønne, og den gamle bark er grønbrun og glat. De skinnende mørkegrønne blade er ret tykke og har en stærk læderagtig fornemmelse. Bladkanterne er knap bølgede og regelmæssigt tornede. Piggene er ret korte og føles lidt skarpe. Blomsterne er små, ret uanselige og hunlige. De efterfølges af orangerøde, kødfulde stenfrugter, som i praksis kaldes "bær". Stammer fra en krydsning mellem *I. aquifolium* og *I. latifolia*. Kan lide en humusrig, fugtig, men veldrænet jord og tåler både sur og kalkholdig jord. Kan tåle meget varme og tørke. Også velegnet til brug i brede alléer.