



Koelreuteria paniculata

'September'



Højde	7 - 17 m
Bredde	7-15m
Trækron	broad, almost round, somewhat irregular, light, open crown
Bark og grene	grey-brown, slightly grooved
Blad	(doubly) pinnate, dull green, 30 - 35 cm, feathered leaf
Efterårsfarve	gul, orange
Blomster	yellow, in large terminal plumes, August/September
Frugter	bladder-shaped, bronze in colour, seeds black, Ø approx. 4.5 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstanddygtigheder	modstanddygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstanddygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Indiana University, Bloomington, USA, 1960

Denne amerikanske selektion vokser i starten hurtigere end arten. Den runde krone bliver bredere og bredere. De brede grene bøjer sig. Det store, fligede (nogle gange dobbeltfligede) blad består af 7-15 bladsegmenter. De er fligede, ca. 7-10 cm lange og har en savtakket bladkant. Bladene er bronzefarvede om foråret og gule til orange om efteråret. De mange små, gule blomster sidder i endestillede, løse klaser på ca. 30 cm. Blomstringen starter 6 til 8 uger senere end hos arten og er ofte meget rig. De ca. 4,5 cm store blærefrugter bliver grønne til bronzefarvede og indeholder nogle få sorte frø. De bliver siddende på træet i lang tid. Foretrækker en beskyttet placering, da unge træer kan blive beskadiget af frost, men kommer sig ellers godt.