

Osmanthus burkwoodii



Højde	2-3 m
Bredde	2-3m
Trækron	oval
Bark og grene	twigs green, bark dark grey, smooth
Blad	evergreen, ovate to oblong-ovate, 2-5 cm long, leaf margin finely serrated, leathery, dark green
Blomster	white, in axillary and terminal bundles, April-May
Frugter	drupe, oval, blue-black, sporadically shaped
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, acid soil
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje, trækasser, lille have, patiohaver
Form	flerstammet træ, enkeltstående nåletræ, hæk
Synonymer	×Osmarea burkwoodii

Osmanthus ×burkwoodii er en stedsegrøn busk, der bliver 2 til 3 m høj. De unge kviste er (lys)grønne, mens den ældre bark er glat og mørkegrå. Bladene, som altid er modsatte, er ovale til aflang-ovale og op til 5 cm lange. De er mørkegrønne og let blanke. Små hvide blomster åbner sig i april og maj. De står i tætte klaser og minder lidt om syrenens blomster (som Osmanthus er i familie med). Blomsterne har en stærk og behagelig duft og er velbesøgte af bier. Kun sporadisk dannes der små blåsorte stenfrugter efter blomstringen. Osmanthus ×burkwoodii opstod omkring 1925 fra en krydsning mellem Osmanthus decorus og O. delavayi.

Fordi O. decorus på det tidspunkt blev anset for at tilhøre en anden slægt, Phillyrea, blev O. ×burkwoodii tidligere kaldt Osmarea ×burkwoodii (en sammentrækning af Osmanthus og Phillyrea).