





Pterostyrax corymbosa



Højde	10 - 15 m
Bredde	10-15m
Trækron	oval, half-open crown
Bark og grene	branches gray to gray brown: bark grey-brown, grooved
Blad	obovate to oval, 6-14 cm long, glossy green
Blomster	in panicles, 3-6 cm long, flowers approx. 1 cm large, white, June
Frugter	drupe, obovate, 1.2-2.2 cm, densely hairy
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	7a (-17,7 til -15,0 °C)
Vindbestandighed	not good
Faunatræ	bitræ
Form	højstammet træ, flerstammet træ

Pterostyrax corymbosus er et mellemstort træ, der kan blive 10-15 m højt. Den brede krone er vifteformet til rund, og på grund af de ret store blade er den tæt. Kvistene er grå til gråbrune, og det samme er den ældre bark, som er let rillet. Grenene er ret skøre, så de knækker let i (meget) kraftig vind. De ret store, blanke blade har en lidt papiragtig fornemmelse. De modne blade er hårløse på oversiden og behårede på undersiden. De hvide blomster sidder i brede klaser, der er op til 6 cm lange, og åbner i juni, lidt tidligere end blomsterne hos P. hispidus. De enkelte blomster er ca. 1 cm store og har en behagelig duft. De bestøves rigeligt af bier. Frugterne af P. corymbosus er ca. 2 cm store og tæt behårede, hvilket er en markant forskel fra de andre arter af Pterostyrax. Pterostyrax corymbosus vokser i alle typer jord, så længe den er tilstrækkelig fugtig. Mere sur eller kalkholdig jord tolereres også godt. Træet har dårlig tolerance over for langvarig tørke. P. corymbosus vokser naturligt på fugtige, skyggefulde bjergskråninger og langs vandløb og floder i det sydvestlige Kina og Japan.

—