




Quercus coccinea 'Splendens'



Højde	8 m
Bredde	12-15m
Trækrone	kugleformet, halvt åben krone med flad top
Bark og grene	kviste brune, med torne, bark gråbrun, let rillet
Blad	bred oval, skinnende mørkegrøn, 5 - 10 cm, efterårsfarve gul, orange og rød
Efterårsfarve	rød
Blomster	hvid, i fittlignende buketter, maj-juni
Frugter	runde, knaldrøde, Ø ca. 1 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	kan ikke tåle våd jord
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	godt
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Knap Hill Nursery, Woking, England, ca. 1900

Danner en bred krone med grene, der står vandret. Barken er mørkegrå til næsten sort og moderat ru. Q. coccinea har en stærk lighed med Q. palustris. Unge kviste af Q. coccinea er dog gulbrune i farven, mens de er olivengrønne hos Q. palustris. Bladene er aflange til ovale (nogle gange omvendt ægformede) og fjerfligede med 7-9 løsvævne, tandede flige. Mindre dybt indskåret end hos Q. palustris og 9-15 cm lange, 6-11 (15) cm brede. Den bliver dybt rød om efteråret. Dette udvalg af Quercus coccinea adskiller sig fra arten ved sin endnu mere intense efterårsfarvning. Når bladene er blevet brune, bliver de siddende på træet indtil midt på vinteren. Agernene sidder enkeltvis og er 1/3 til halvt omsluttet af luppen.