




Quercus robur 'Timuki'



Højde	15 - 20 m
Bredde	8-12m
Trækron	round, half-open crown
Bark og grene	twigs dark brown, bark dark grey, deeply grooved
Blad	obovate, lobed, dark greenish purple, 7 - 14 cm
Blomster	green-yellow catkins, 2 - 4 cm, May
Frugter	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	fertile and moist
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	industriområde
Form	højstammet træ
Oprindelse	Raimond Cinovskis, Riga, Latvia, 1946

Rødbladet sort af Q. robur med en bredt ægformet til til sidst rund krone. Vokser betydeligt bedre end den gamle purpurbladede sort 'Purpurascens'. Barken, blomstringen og frugterne ligner artens. De omvendt ægformede blade har også samme form som arten, men er større end hos 'Purpurascens'. Bladene springer ud som grønne, men bliver gradvist mørkere for til sidst at blive blanke mørkegrønne-lilla i sensommeren via røde. Træet blev fundet af M. Timuki i 1939, men blev først navngivet og distribueret i 1946. God vækst og smukke bladfarver er de vigtigste kendetegn ved denne purpurbladede eg. Desuden er 'Timuki' betydeligt mindre modtagelig for meldug.