



Quercus suber



Højde	6 - 15 (20) m
Bredde	6-15m
Trækro	uregelmæssig, mere eller mindre afrundet, halvåben kro
Bark og grene	lyse gråbrune, dybe riller med meget kork
Blad	ovale til ægformede, fligede, mørkegrønne, 3 - 9 cm, stedsegrønne
Blomster	gule ♂ kattekillinger
Frugter	ægformet agern, 1,5 - 3 cm langt
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	stiller få krav, kan tåle tørre forhold
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	8b (-9,4,5 til -6,7 °C)
Vindbestandighed	ret
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	trækasser, taghaver, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	det vestlige Middelhavsområde, især Spanien og Portugal

Meget velkendt stedsegrønt egetræ fra det vestlige Middelhavsområde. Traditionelt dyrket til korkudvinding, hvortil det afbarkes hvert 7. år. Den uregelmæssige kro er først oval, men bliver senere bredere og mere eller mindre rund. Den bløde bark er gråbrun og har kun dybe riller fra det fjerde år. Når den er afbarket, er stammen ildrødbrun i farven. Det stedsegrønne, tandede blad er ovalt til ægformet og skinnende mørkegrønt. På undersiden er det filtet og gråhvidt. De lange, ægformede agern står alene eller sammen i par og måler 1,5-3 cm. De er en tredjedel til halvdelen omsluttet af loppen. Q. suber kan blomstre næsten hele året, så man kan også se agern det meste af året. Quercus suber er en løvfældende eg, der traditionelt er blevet plantet til korkudvinding. Først ved en stammediameter på ca. 60 cm kan korkbarken høstes.