



Robinia pseudoacacia

'Appalachia'



Højde	15 - 20 m
Bredde	10-15m
Trækron	broad oval, transparent, half-open crown
Bark og grene	greyish brown, roughly grooved, twigs olive-green to brown with small thorns
Blad	imparipinnate, 20 - 30 cm, 9 to 19 leaf segments, 1.5 – 4.5 cm, green, feathered leaf
Blomster	pendulous clusters up to 15 cm, cream white, approx. 2 cm, aromatic, June, fragrant flowers
Frugter	flat, leathery pod, reddish brown, 5 -10 cm long, remains on tree a long time
Torne	ja
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	places little demands on soil, provided there is good drainage
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	moderate, particularly in rich soil
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Hopp, USA, 1945

En hurtigtvoksende selektion, der er kendetegnet ved en bemærkelsesværdig ligevoksende stamme. Kronens form er først smalt opret, senere bredt oval, og den gråbrune bark er ru og dybt rillet. Unge kviste er olivengrønne til brune. Grenene er besat med små skarpe torne. De ujævnt fligede blade har 9 til 19 lange ovale, mørkeblågrønne småblade, der måler 2 - 4,5 cm. Spredt sig sent om foråret. Forbliver langbladet om efteråret. Efterårsfarven er gul. Kompakte, hængende klaser af cremehvide, nogle gange let rosa, duftende blomster dukker op i juni. 'Appalachia' blomstrer kraftigere end arten. Blomstringen efterfølges af bælgplanter, som ofte bliver siddende indtil vinteren. Vokser godt på let, kalkholdig jord, rod fæster sig overfladisk og laver regelmæssige rodkud. Mindre følsom over for vind end arten.