




Robinia viscosa



Højde	6 - 10 (12) m
Bredde	6-10m
Trækron	broad ovoid, half-open crown
Bark og grene	grey, rough grooves, brownish red twigs, very sticky
Blad	imparipinnate, with 11 - 21 leaf segments, green, 2 - 5 cm, feathered leaf
Blomster	tight clusters of light pink flowers, June/July
Frugter	flat pod, dark brown, very hairy, sticky, 4 - 8 cm
Torne	ja
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	places little demands on soil, provided there is good drainage
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	sensitive
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt, bitræ
Anvendelse	industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	eastern and south-eastern USA

I sit naturlige udbredelsesområde bliver det op til 12 m højt, men i dyrkning bliver det normalt kun 8 m. Træet har en rund til bred ægformet krone. Det mest iøjnefaldende er de mange klæbrige dele. De brunrøde kviste uden pigge er tæt dækket af klæbrige kirtelhår. De uligefinnede blade består af 11-21 småblade. De er ægformede med en spids spids og 2 - 5 cm lange. De er mørkegrønne og glatte på oversiden, gråhårede og let klæbrige på undersiden. De mørkerøde bladstilke er også klæbrige. Remonstrants blomstring begynder i juni og kan fortsætte ind i august. De lyserøde blomster sidder i op til ca. 10 cm lange klaser. Blomsterne er ikke velduftende. Flade bælgplanter følger om efteråret. De er 4-8 cm lange og tæt dækket af klæbrige kirtelhår.