



Sorbus alnifolia



Højde	8 - 12 (15) m
Bredde	4-8m
Trækron	ovoid to round, half-open crown
Bark og grene	smooth dark grey bark, branches purplish-brown
Blad	oval, top with a short point, remarkable lateral veins, dull green, 5 - 11 cm
Efterårsfarve	orange, rød, lilla
Blomster	in umbels, Ø approx. 5 cm, white, May/June
Frugter	round to oval, red with yellow, Ø 0.8 - 1.5 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	well drained nutritious soil
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	fairly
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), træ med næring til fugle
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ
Oprindelse	East Asia
Synonymer	Micromeles alnifolia

Voksede oprindeligt i Østasien og nåede der en højde på ca. 15 m. I Europa er det fortsat mindre, ca. 8-10 m. Træet har mørkegrå, glat bark. Unge kviste er olivenbrune og bliver senere mørkere. Bladknopperne er påfaldende rødbrune. Det ovale blad minder meget om elletræets (Alnus). Det har 10 - 15 par fremtrædende årer, og bladkanten er fint dobbelttakket. Det er matgrønt på oversiden, lysegrønt på undersiden og svagt håret til glat. Om efteråret farves den i rosa, orange og røde nuancer. Blomstringen efterfølges af gule frugter, som langsomt bliver røde. I forskellige stadier udgør de en særlig dekorativ værdi om efteråret. Krydsbestøvning er nødvendig for frugtsætning, så det er tilrådeligt at plante flere eksemplarer sammen.