



Tilia platyphyllos



Højde	30 - 35 (40) m, hurtigt voksende
Bredde	20-25m
Trækroner	bred ægformet til afrundet, halvåben krone
Bark og grene	lysegrå og rillede, kviste nøgne og brunrøde
Blad	skråt hjerteformet, kort tilspidset, mat grøn, 6 - 12 cm
Blomster	i hængende skærme, 3 - 5 blomster sammen, gule, juni/juli, duftende blomster
Frugter	omvendt ægformet, grå, Ø 0,8 - 1,2 cm, grå filtignende hår
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	alle
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	god, modtagelig for havvind
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Vest-, Central- og Sydeuropa

Den storbladede lind har en bred, ægformet til afrundet krone og en afrundet top. Stammen er tung og uregelmæssig, lysegrå og senere rillet. Normalt sidder de tunge sidegrene lavt på stammen. Der vokser normalt en masse rodlager ved stammens basis. Årskvistene er hårde og rødbrune og bliver nøgne om vinteren. Bladet på T. platyphyllos springer ud 14 dage tidligere end T. cordata, og det er også større. Bladformen er hjerteformet med en spids spids og en skæv hjerteformet basis, og bladkanten er skarpt savtakket. På oversiden er bladene mørkegrønne, på undersiden lysere grønne og blødt hårede. De duftende blomster sidder i hængende klaser, 3 til 5 sammen, og højbladene er tydeligt stilkede og ca. 5 cm lange. T. platyphyllos er ikke særlig modtagelig over for bladlus. Meget stærkt træ.