



Viburnum plicatum 'Mariesii'



Højde	2-3 m
Bredde	2-3m
Trækron	flatened spherical, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	brown
Blad	green
Efterårsfarve	rød
Blomster	white, flowers in May
Frugter	red, black
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	loamy soil, sandy soil, peaty soil, calcareous soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), træ med næring til fugle
Anvendelse	patiohaver

'Mariesii' er en bred busk med en fladtrykt vækstform, der bliver ca. 1,5 m høj og dobbelt så bred. Meget gamle eksemplarer kan blive mere end 2 m høje. Stammens grene er påfaldende vandrette, så busken vokser typisk i etager. Bladene er ægformede til ovale og 3-8 cm lange. De er lysegrønne om sommeren og bliver røde om efteråret. I maj åbner de flade skærme, der måler op til 10 cm i diameter. De består af 6-8 sterile randblomster og mange frugtbare blomster i midten af blomsterstanden. De sterile randblomster er op til 4 cm store og hvide. 'Mariesii' producerer ikke mange frugter, men de, der dannes, er røde og modner omkring august.

. På grund af sin brede og lave vækstform er 'Mariesii' velegnet til brug i haver og parker. Busken vokser på enhver jord, men er mindre egnet til anvendelse på våd jord, tung ler, meget tør jord eller meget sur jord.

. 'Mariesii' blev indsamlet i Japan af Charles Maries til Veitch's Nursery mellem 1877 og 1879. Veitch markedsførte sorten i 1902 og ærede den oprindelige finder ved at navngive planten 'Mariesii'.

Hårdførhedszone 5b .