



Koelreuteria bipinnata



Højde	9-12 m
Bredde	7-10m
Trækron	irregularly round
Bark og grene	twigs dark brown, bark grey-brown, slightly grooved
Blad	double to triple pinnate, up to 50 cm long, leaves smooth-edged
Efterårsfarve	gul
Blomster	yellow, in large terminal panicles up to 30 (50) cm long, August-September
Frugter	vesicular, pink to pink-red
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	7 (-17,7 til -12,3 °C)
Vindbestandighed	moderate
Faunatræ	værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ

Ved første øjekast ligner Koelreuteria bipinnata meget den mere kendte K. paniculata. Alligevel er der de nødvendige forskelle. Årskvistene hos K. bipinnata er op til tre gange tykkere end hos K. paniculata. Desuden er de sammensatte blade dobbelt til tredobbelt fligede, hvor de hos K. paniculata er fligede til undertiden dobbelt fligede. Bladene er ikke fligede hos K. bipinnata. En vigtig forskel viser sig også efter blomstringen; de blæreformede frugter hos K. bipinnata er smukke pink til pink-røde. Desværre kan denne art også let sprede sig, især på varmere steder. Træet danner en uregelmæssigt afrundet krone, som senere sænker sig lidt. Det gør K. bipinnata næsten uegnet som allétræ. Helt bortset fra, at brolægning ikke tolereres. Takket være sin gode tørke- og varmetolerance klarer træet sig godt som solitær på solrige steder. Desuden tiltrækker blomsterne rigtig mange bier.

—