



Ostrya carpinifolia 'F.C. Moree'



Højde	12 - 15 m
Bredde	8-15m
Trækron	regular branches, pyramidal crown
Bark og grene	brown-grey, grooved, branches olive green
Blad	ovoid to oval, green, double serrated leaf edge, 5 - 10 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	yellow-green catkins, ? about 4 - 6 cm, ? catkins shorter, April
Frugter	nutlets, in fruit resembling hops
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	likes calcareous soil
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstanddygtigheder	modstanddygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstanddygtig mod vind
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ
Oprindelse	U.S. National Arboretum, Washington D.C., USA, 1999

'F.C. Moree' er en sort af humlebøg, *Ostrya carpinifolia*. Overfladisk set ligner *O. carpinifolia* *Carpinus betulus*, avnbøgen, men adskiller sig fra den ved sine karakteristiske frugter, som ligner humlekogler. 'F.C. Moree' har en regelmæssigt forgrenet, pyramideformet krone og bliver 12-15 m høj. Den brungrå bark er i lang tid glat, men senere let rillet og med uregelmæssige lysegrå pletter. Bladene er som hos arten *O. carpinifolia*; ægformede til ovale og 5-10 cm lange. Om efteråret bliver de gule. I april blomstrer træet med hængende katte, som efterfølges af de markante frugter, der ligner humlekopper.

. 'F.C. Moree' er et letvoksende træ med få krav til jorden. Træet er udvalgt af Bart van de Sluis fra Randwijk og opkaldt efter Frans Moree, som dengang var formand for planteskoleforeningen Kring Opheusden.

Hårdførhedszone 5b .