



Cedrus libani subsp. atlantica



Højde	20 - 25 (40) m
Bredde	10-15m
Trækron	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	dark greyish black bark, scaly, twigs have downy hair
Blad	needles, light green to silvery blue, 2 - 2.5 cm, evergreen
Blomster	unremarkable, fragrant flowers
Frugter	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	all, provided well-permeable and not too moist
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	7a (-17,7 til -15,0 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod vind
Anvendelse	industriområde
Form	højstammet træ, højstammet nåletræ, enkeltstående nåletræ
Oprindelse	Atlas mountains (north-eastern Algeria and northern Morocco)
Synonymer	Cedrus atlantica

Denne geografiske underart af Cedrus libani er et hurtigtvoksende stort træ med vandrette grene senere i livet. Den vokser naturligt på tørre, kalkholdige bjergskrånninger i Atlasbjergene i det nordvestlige Afrika. Stammen er stadig grå og glat i starten, men bliver grovere på gamle træer. Senere løsner den sig i små plader og frigiver den rødbrune bark. Forgreningen er ret løs og åben, og kvistene er i begyndelsen stadig grågrønne til gråbrune, men bliver grå i løbet af det andet år. Nålene sidder i bundter på 20 - 40 sammen og er 2 - 2,5 cm lange. De opretstående kogler kommer frem om efteråret. Unge kogler er grønne, men bliver senere purpurbrune til brune. Dette cedertræ kræver meget sol og kan godt tåle luftforurening.