



Acer campestre



Højde	ca. 12 m
Bredde	7-8m
Trækron	oval, mørk, tæt krone, lunefuld voksende
Bark og grene	grå bark med iøjnefaldende korkede revner
Blad	3/5 lapper, mørkegrønne, 6 - 10 (12)cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	små, afsluttende blomsterstande, gulgrønne, maj
Frugter	enkeltfrøede vingede nødder, altid parret
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	enhver jord, undtagen tør, ufrugtbar sandjord
Jordfugtighed	modstandsdygtig mod kort oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	meget god
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, trækasser, taghaver, kubusformet, industriområde
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	Europa, Vestasien og Nordafrika

Acer campestre er et mellemstort træ, der bliver ca. 12 m højt. På grund af den uregelmæssige forgrening dannes der ikke en symmetrisk krone. Grenene har karakteristiske korkstriber, både på gammelt og ungt træ. Det unge løv er undertiden lidt rødligt, når det springer ud, men bliver hurtigt mørkegrønt. Efterårsfarven er mørkegul og kan være langvarig. A. campestre er hjemmehørende i Holland og har været brugt af mennesker i meget lang tid. Ikke kun som træ, men også beskåret som hæk er denne plante meget funktionel. Takket være det faktum, at A. campestre tåler skygge og kan vokse i industriområder, er det en alsidig plante. Den danner en stærkt forgrenet hovedrod med rigtig mange hårrødder. Da denne plante formeres ved såning, kan der forekomme en vis variation i afkommet. Det viser sig ved, at nogle karakteristika (efterårsfarve, korkstriber på grenene) er til stede i større eller mindre grad. Acer campestre bruges også ofte som hækplante, fordi den tåler

beskæring usædvanligt godt. På grund af den tidlige saftstrømning bør beskæring dog aldrig finde sted om foråret.