



Acer cappadocicum 'Rubrum'



Højde	10 - 15 m
Bredde	6-9m
Trækron	flattened, round, wide crown, half-open crown
Bark og grene	young twigs dark purple at first, later dark green
Blad	5/7 lobes, pointed, unfurling deep purple
Efterårsfarve	gul
Blomster	yellow-green corymbs, 6 - 7 cm, May
Frugter	winged
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	humic, not too dry
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Baumschulen Booth, Germany, 1838

Acer cappadocicum 'Rubrum' ligner i alle dele og egenskaber den tidligere beskrevne 'Aureum'. Den eneste forskel er bladfarven. De unge blade på 'Rubrum' er dybt purpurrøde og bliver mørkt rødgrønne i løbet af sommeren. Om efteråret bliver bladene dybt gule. I modsætning til den gulbladede 'Aureum' er 'Rubrum' ikke tilbøjelig til at brænde bladene i solrige perioder om sommeren. 'Rubrum' er et glimrende gade- og parktræ, men tåler brolægning mindre godt end den gulbladede 'Aureum'.