



Acer davidii



Højde	8 - 12 (15) m
Bredde	7-11m
Trækro	oval to round, light, open crown, capricious growing
Bark og grene	twigs purple with greyish white longitudinal stripes
Blad	oval to elongated, dark green, 8 - 16 cm
Efterårsfarve	gul, orange, rød
Blomster	pendent corymb-shaped racemes, light yellow, May
Frugter	single-seeded, single-winged, light green
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	all soils
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Central China

Med sin markant sribede bark hører *Acer davidii* ligesom *A. capillipes* og *A. rufrum* til de såkaldte 'slangeskinsahorn'. De unge kviste er mørkt purpurøde og bevarer denne farve selv om vinteren. De ældre kviste og stammen har de karakteristiske gråhvide længdestriber. Bladene er mindre tydeligt fligede, og i modsætning til *A. capillipes* er de behårede på undersiden langs årerne. Hos unge planter er bladet trefliget, hos gamle(re) træer ufliget. Blomsterne er enkönnede med han- og hunblomster på samme plante. Planten har et stærkt forgrenet og kompakt rodsystem. Da planten er mindre egnet til plantering i brolægning, er dens anvendelse begrænset til plantning som solitær i parker og større haver. Dette prydtæ gør sig også godt i grønne bælter.