




Acer palmatum 'Bloodgood'



Højde	8 - 10 (12) m
Bredde	8-10m
Trækron	bred ægformet til ægformet, mørk, tæt krone, lunefuld voksende
Bark og grene	glad, gråbrun
Blad	håndformet med 5-7 bladflige, sort-rød, sort-rød
Efterårsfarve	rød
Blomster	røde blomstercorymboler, maj
Frugter	enkelte frø, bevingede, altid parvis, røde
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	alle, undtagen ler, og ikke for tørt
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6 (-23,3 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	moderat
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Anvendelse	trækasser, taghaver, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Bloodgood Nurseries, New York, NJ, USA, vor 1940

Acer palmatum 'Bloodgood' er en storslået stor busk, der vokser op til et lille træ og i særlige tilfælde kan blive mere end 10 m høj. 'Bloodgood' stammer fra en frøplante af 'Atropurpureum', men adskiller sig markant fra den. Kronen er betydeligt smallere, og bladene er sortrøde hele sommeren og bliver smukt dybrøde om efteråret. Også frugterne er mere intenst røde. 'Bloodgood' formeres ikke kun ved podning, men kan også godt formeres ved hjælp af stiklinger. Planter, der formeres ved hjælp af stiklinger, vokser langsommere end podede eksemplarer. Selvom den er navngivet af det amerikanske Bloodgood Nurseries, antydes det nogle gange, at 'Bloodgood' blev fundet af Boskoop-gartneriet Ebbinge & Van Groos og eksporteret til Amerika.