



Acer platanoides 'Reitenbachii'



Højde	15-20 m
Bredde	10-12m
Trækron	broad ovoid, dark, dense crown
Bark og grene	grey
Blad	green, redbrown
Blomster	yellowgreen, flowers in April
Frugter	brown, inconspicuous
Torne	ingen
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Jordfugtighed	modstandsdygtig mod kort oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	not very sensitive, not resistant to sea wind
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ

Historien om Acer platanoides 'Reitenbachii' går tilbage til J. Reitenbachs planteskole i Polen, dengang Rusland. Planten blev navngivet af Johann Xaver Robert Caspary, en tysk botaniker, men det var Louis Van Houttes belgiske gartneri, der markedsførte den. Med hensyn til vækstform ligner 'Reitenbachii' arten. De udfoldede blade er skinnende mørkebrune og bliver matte mørkegrønne med mørkerøde årer om sommeren. Smukt træ, der minder lidt om 'Schwedleri', hvis bladfarver er mere intense. Vokser på alle jorde, men tåler ikke stillestående grundvand og tørveholdige jorde.