




Betula costata



Højde	12 – 25 (30) m
Bredde	10-15m
Trækron	broad ovoid to round, half-open crown
Bark og grene	light grey-brown to greyish yellow, flaking
Blad	ovoid to narrow ovoid, green, 5 - 10 cm
Blomster	catkins, ♀ single and erect, ♂ 4 - 6 cm, April
Frugter	ovoid fruiting catkins, 2 - 3 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	few soil requirements, not drought-tolerant
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Eastern and central China, Korea, Manchuria

Stort træ med en bred, ægformet til rund, halvåben krone. Kræver meget plads på grund af sin brede og relativt lave forgrening. Har smukt afskalede grene og bark. Må ikke forveksles med typer af *B. ermanii*, især 'Blush', som stadig dyrkes som *B. costata*. Nogle af forskellene er, at barken på *B. costata* begynder at skalle af allerede i det andet eller tredje år, mens det hos *B. ermanii* først begynder senere i livet. Årskvistene hos *B. costata* er ru, mens de er glatte hos *B. ermanii*. Endelig er bladet hos *B. costata* mere end dobbelt så langt som bredt og har en lige bladbasis. Hos *B. ermanii* er bladet kortere og har en let hjerteformet bladbasis. Tåler dårligt tørke og er følsom over for (sø)vind.