



Catalpa xerubescens



Højde	10 - 12 (15) m
Bredde	6-10m
Trækron	wide pyramidal, later ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	grey, shallow fissures
Blad	heart-shaped to wide oval, from purple to green, 15 - 20 cm
Blomster	white, in erect panicles, July/August (September)
Frugter	thin capsules, to 35 cm long
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, not in wet soils
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderate to poor
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Form	højstammet træ
Oprindelse	France, ± 1869

En krydsning i kultur mellem *C. bignonioides* og *C. ovata*. Har kraftige hovedgrene og vokser fra buskform til et mellemhøjt træ. Den oprindeligt pyramideformede, men senere afrundede krone er halvåben. Det hårde ved er skørt. De spidse og helt glatkantede, hjerteformede til bredovale blade dukker op sent om foråret og er svagt purpurbrune og bliver senere mørkegrønne. Unge planter har ofte større blade, op til 30 cm. De falder af relativt tidligt. De hvide, klokkeformede blomster er lidt mindre end hos *C. bignonioides* og sidder i 20 til 30 cm lange, oprette klaser. Indeni er blomsterne gule med små brune prikker. De efterfølges af 25 til 35 cm lange kassefrugter, der højst er 1 cm tykke. De bliver siddende på træet om vinteren.