



## Celtis occidentalis



|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Højde</b>                       | 8 - 15 (30) m                                                                     |
| <b>Bredde</b>                      | 6-12m                                                                             |
| <b>Trækron</b>                     | round, irregular , half-open crown, capricious growing                            |
| <b>Bark og grene</b>               | grey, irregularly corky-winged                                                    |
| <b>Blad</b>                        | ovate-lanceolate, green, 7 - 15 cm                                                |
| <b>Efterårsfarve</b>               | gul                                                                               |
| <b>Blomster</b>                    | inconspicuous, green, April/May                                                   |
| <b>Frugter</b>                     | round stone fruit, purple black, Ø circa 1 cm                                     |
| <b>Torne</b>                       | ingen                                                                             |
| <b>Toksicitet</b>                  | normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr                     |
| <b>Jordtype</b>                    | few requirements                                                                  |
| <b>Jordfugtighed</b>               | Tåler tør jord                                                                    |
| <b>Krav til vækststedet</b>        | Tåler hærkning                                                                    |
| <b>vinterhårdhed</b>               | 4 (-34,4 til -28,9 °C)                                                            |
| <b>Vindbestandighed</b>            | slightly susceptible                                                              |
| <b>Øvrige modstandsdygtigheder</b> | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)                                 |
| <b>Faunatræ</b>                    | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle |
| <b>Anvendelse</b>                  | alléer og brede veje, industriområde                                              |
| <b>Form</b>                        | højstammet træ, flerstammet træ                                                   |
| <b>Oprindelse</b>                  | central and eastern part of North America                                         |

Et træ med en uregelmæssigt voksende kroneform, der er hjemmehørende i Nordamerika. Nogle få steder kan man finde eksemplarer på over 20 m, nogle gange 30 m. Det forgrener sig ret lavt og danner nogle gange et flerstammet træ med mange stærkt hængende kviste. Stammen er takket med dybe indhak og mange buler. Bladene er aflange, ægformede, langspidsede og blankt grønne. Undersiden er mere mat. Den øverste halvdel af bladkanten er skarpt savtakket, og begge sider af bladet føles ru. Om efteråret bliver det påfaldende gyldent. Efter en diskret blomstring kommer der små stenfrugter, som bliver orange til lilla-sort. De kan blive siddende på træet hele vinteren. Træet er værdifuldt, og de unge, bøjelige kviste blev engang brugt som piske.