



## Cornus kousa



<b>Højde</b>	4 - 8 m
<b>Bredde</b>	4-8m
<b>Trækrone</b>	bred vaseformet til rund, halvåben krone, lunefuld voksende
<b>Bark og grene</b>	grå, senere let afskalende
<b>Blad</b>	ovale til ovale, mørkegrønne, 5 - 9 cm
<b>Efterårsfarve</b>	gul, orange, rød
<b>Blomster</b>	grøn-gul i hoveder, højblade hvide, maj/juni
<b>Frugter</b>	jordbær lignende, sammensat dyrket stenfrugt, rød
<b>Torne</b>	ingen
<b>Toksicitet</b>	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
<b>Jordtype</b>	veldrænede jorde
<b>Krav til væksstedet</b>	Tåler ikke hærdning
<b>vinterhårdhed</b>	6b (-20,5 til -17,8 °C)
<b>Vindbestandighed</b>	godt
<b>Øvrige modstandsdygtigheder</b>	modstandsdygtig mod frost (winterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
<b>Faunatræ</b>	modstandsdygtig mod frost (winterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
<b>Anvendelse</b>	trækasser, taghaver, lille have, patiohaver
<b>Form</b>	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
<b>Oprindelse</b>	Japan, Korea og det centrale Kina
<b>Synonymer</b>	Benthamia japonica

Flerstammet træ, der vokser fra buske. Hjemmehørende i bjergskove i Kina, Japan og Korea. Kronebredde ca. 4 - 5 m. Væksten er langsom, især senere i livet. Bladene er mørkegrønne og let bølgede. Undersiden er blågrøn og let håret, og efterårsfarven er i nuancer af gul og skarlagrenrød. Hvert hoved med uanselige blomster er omgivet af 4 ca. 8 cm store bractae (støtteblade), der er cremehvide til lysende hvide. I fuld blomst er den særligt dekorativ. De røde, jordbær lignende frugter er ca. 2 cm i diameter og sidder på ca. 4 cm lange, røde stængler. Planten rodfæster sig overfladisk med et fint rodssystem. Kræver humusrig jord. Tåler mere tørke og er noget mere hårdfør end C. florida. Der er flere gode sorter i kultur, for det meste udvalgt fra sorten chinensis.