




# Kalopanax septemlobus

## maximowiczii



ja

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Højde</b>                       | 10-15(25) m                                                   |
| <b>Bredde</b>                      | 10-15m                                                        |
| <b>Trækronen</b>                   | round/spherical, light, open crown, capricious growing        |
| <b>Bark og grene</b>               | trunks set with many spines                                   |
| <b>Blad</b>                        | green                                                         |
| <b>Blomster</b>                    | white, flowers in July                                        |
| <b>Frugter</b>                     | blue, black                                                   |
| <b>Torne</b>                       | ja                                                            |
| <b>Toksicitet</b>                  | normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr |
| <b>Jordtype</b>                    | clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil               |
| <b>Krav til vækststedet</b>        | Tåler ikke hærkning                                           |
| <b>vinterhårdhed</b>               | 5b (-26,0 til -23,4 °C)                                       |
| <b>Vindbestandighed</b>            | good                                                          |
| <b>Øvrige modstandsdygtigheder</b> | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)             |
| <b>Anvendelse</b>                  | industriområde                                                |

Sorten maximowiczii er måske endnu mere karakteristisk end arten K. septemlobus. Det er et mellemstort til stort træ, der bliver 10 til 15 m højt, højere under gunstige forhold. De tykke kviste er dækket af skarpe pigge. På den ældre bark forsvinder piggene, hvorefter barken bliver rillet. De store blade sidder hovedsageligt i spidsen af kvistene. De er håndfligede og dybt fligede. Fligene er indskåret næsten helt ned til bladets basis, hvilket giver bladene et yndefuldt, næsten tropisk udseende. Bladene er lysegrønne, når de folder sig ud, og de er blanke og mørkegrønne om sommeren. Om efteråret bliver de dybt gule til gulbrune, inden de falder af. I sensommeren kommer de brede, skærmformede klaser af små, hvide blomster frem. De enkelte blomster er arrangeret i kugleformede bundter, som tilsammen danner klaserne. Risene er ca. 30 cm lange og brede og bliver overfyldt af bier. Efter blomstringen kommer de små blåsorte bær, som også er dekorative. K. septemlobus var. K. septemlobus var. maximowiczii vokser bedst i næringsrig, fugtig jord i fuld sol. Fra naturens side er det et træ, der vokser i bunden af bjergskråninger og langs flodbredder. Tåler ikke brolægning og er derfor et parktræ par excellence. Hårdførhedszone 5b .