



Liquidambar orientalis



Højde	7 - 10 m, up to 30 m in natural habitat
Bredde	6-8m
Trækron	dense, ovoid, dark, dense crown
Bark og grene	grey bark, corky wings on twigs several years old
Blad	palmate lobed to incised, dark green, 4.5 - 7.5 cm long
Efterårsfarve	gul, rød
Blomster	yellowish-green, unremarkable, end of April
Frugter	ovoid, spiky fruit capsule on a long stalk, approx. 2 - 3.5 cm in length
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	nutritious, humid soils
Jordfugtighed	Tåler våd jord, modstandsdygtig mod kort oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	8 (-12,2 til -6,7 °C)
Vindbestandighed	moderate
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	Asia Minor

Busket busk til lille træ, der danner en særlig tæt forgrenet ægformet krone med overhængende grene. Stammen bliver grå og er rillet. Unge kviste er gulgrønne og bliver rødbrune. Ældre grene udvikler korkagtige riller. Det 5-fligede blad er mindre og bredere end hos *L. styraciflua* og også mere dybt fliget til kløvet. Bladranden er også fliget. Bladet er 4,5 - 7,5 cm langt og 7 - 10 cm bredt. Om efteråret bliver det rødt. Efter den uanselige blomstring kommer de ca. 2,5 cm store, brune kassefrugter frem. De er stikkende, hænger på lange, tynde stængler og bliver siddende på træet langt ind i vinteren. I varme klimaer er det et særligt dejligt parktræ, men på koldere steder skal træet absolut beskyttes mod hård frost.