



Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'



Højde	20 m
Bredde	8-12m
Trækron	broad pyramidal, relatively open, half-open crown
Bark og grene	dark grey, deeply grooved, corky fissures on branches and twigs
Blad	palmately lobed, 5 - 7 lobes, glossy green, 8 - 16 cm long
Efterårsfarve	gul, orange, rød, lilla
Blomster	yellow-green, inconspicuous, April/May
Frugter	round, spiky capsule on long stem, 3 - 3.5 cm long
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	fertile, loamy soil
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	Hillier Nurseries, Ampfield, Romsey, England, 1971

Stort træ med en bred pyramideformet, ret åben krone. Den grå bark er dybt rillet. De unge kviste er lysegrønne og har korkagtige riller, som bliver siddende på grenene indtil senere i livet. De toårige grene er rødbrune. Bladene bliver mørkt vinrøde til sortrøde med gule nuancer om efteråret. De runde, stikkende frugter bliver siddende på træet om vinteren. I 1960'erne købte en Dr. Lane Roberts en Liquidambar-plante fra Hillier Nurseries. I slutningen af 1960'erne ringede Roberts til Harold Hillier for at fortælle ham, at hans træ havde en smuk efterårsfarve. Hillier bad om formeringsmateriale, opkaldte træet efter sin kunde og introducerede sorten i 1971. Godt træ til brede gader, alléer og grønne områder. Kan lide frugtbar, fugtig jord og tåler ikke længerevarende tørke.