




Ostrya virginiana



Højde	8 - 20 m
Bredde	8-15m
Trækrone	round, dark, dense crown
Bark og grene	bark grey-brown, grooved, young twigs bear hairs
Blad	elongated ovoid to oval, green, 6 - 12 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	yellowish-green catkins, ♂ 4-5 cm long, ♀ 2 - 2.5 cm long, April
Frugter	nutlets, in fruit resembling hops
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	likes calcareous soil
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	central and eastern part of the United States

Den er hjemmehørende i store dele af Nordamerika, hvor den er en populær producent af løvtræ ('jerntre'). Dens meget lave forgrening er slående: Stammen er ofte ikke mere end en halv meter høj. De hængende sidegrene danner til sidst en kolossal krone. Den korte stamme er brungrå, rillet og løsnet i smalle, små plader. Hos ældre træer bliver den stadig mørkere. Unge kviste er hårede, senere nøgne. De lange ægformede til ovale blade har en dobbeltsidet bladkant og bliver påfaldende gule om efteråret. Bladgrunden er mere hjerteformet end hos *O. carpinifolia*. Blomstrer med gulgrønne hanblomster, der er 4-5 cm lange, og hunblomster i små aks. Disse udvikler sig til frugter, der er formet som humlekopper og er ca. 6 cm lange.