



## Quercus xturneri 'Pseudoturneri'



|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Højde                       | 8 - 10 (15) m                                                   |
| Bredde                      | 8-10m                                                           |
| Trækron                     | bred kugleformet til rund, halvåben krone                       |
| Bark og grene               | gråbrune, rillede, kviste lysegule og dækket af filtignende hår |
| Blad                        | aflange til ovale, med fliget/skåret kant, grønne, 7 - 13 cm    |
| Blomster                    | filtignende, gråhvide katte, maj                                |
| Frugter                     | smalt ægformet agern, 2 - 2,5 cm, i grupper på 3 til 7          |
| Torne                       | ingen                                                           |
| Toksicitet                  | normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr   |
| Jordtype                    | næringsrig, leret jord, helst fugtig                            |
| Krav til vækststedet        | Tåler ikke hærkning                                             |
| vinterhårdhed               | 7b (-14,9 til -12,3 °C)                                         |
| Vindbestandighed            | ret                                                             |
| Øvrige modstandsdygtigheder | modstandsdygtig mod vejsalt                                     |
| Form                        | højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ                    |
| Oprindelse                  | England, ca. 1880                                               |

Quercus turneri er et semi-stedsegrønt træ, som er resultatet af en krydsning mellem Q. ilex og Q. robur. 'Pseudoturneri' er en helt stedsegrøn sort, der udvikler sig fra buskform til et til tider flerstammet træ med en højde på 8-10 m. Vækstformen er opret, senere bredspredt. Unge kviste er lysegule og filthårede. Bladet er læderagtigt, 5 - 13 cm langt og 2,5 - 4 cm bredt og har 4 til 8 par overfladiske flige eller tænder. På oversiden er det mørkegrønt, på undersiden gråt og filthåret. De stedsegrønne blade falder først af efter vinteren, når der kommer nye blade. Den markante blomsterstand står i flot kontrast til de skinnende mørkegrønne blade. De langstilkede agern er en tredjedel til halvdelen omsluttet af luren.