



Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'



Højde	8 - 10 m
Bredde	3-5m
Trækron	ovoid, half-open crown
Bark og grene	grey, smooth, later a little flaky
Blad	imparipinnate, approx. 20 cm long, 9 - 17 (21) leaflets, dark green, feathered leaf
Efterårsfarve	orange, rød
Blomster	in umbels, Ø approx. 15 cm, white flowers, May/June
Frugter	orange-yellow, in wide umbels, August/September
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	preferably slightly acid humic soil
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ
Oprindelse	Brouwers Boomkwekerij B.V., Groenekan, The Netherlands, circa 1950

Træet danner en ret tæt, ægformet krone, som senere bliver mere rund. De uligefinnede blade består af 9-17 (21) lancetformede småblade. De er 5 - 7 cm lange, 2 - 3 cm brede og har en fint savtakket bladkant. Efterårsfarven er orangerød. De store fittlignende blomsterstande består af mange hvide blomster. De orangegule frugter, som er ca. 1 cm i diameter, kommer allerede i august og bliver siddende på træet til omkring midten af september. Frugtsætningen er mindre end hos andre sorter. Schouten' foretrækker let sur, humusrig jord, men trives også på tør sandjord. Træet blev fundet i et parti S. discolor-planter omkring 1950. Senere viste det sig, at 'Schouten' tilhører hybriden S. x arnoldiana.