




## Sorbus americana



|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Højde</b>                       | 10 - 12 m                                                                   |
| <b>Bredde</b>                      | 6-8m                                                                        |
| <b>Trækrone</b>                    | ovoid to round, half-open crown                                             |
| <b>Bark og grene</b>               | bark grey, twigs glossy reddish-brown                                       |
| <b>Blad</b>                        | imparipinnate, approx. 25 cm, 13 - 17 leaf segments, green, feathered leaf  |
| <b>Efterårsfarve</b>               | gul, orange                                                                 |
| <b>Blomster</b>                    | in umbels, Ø approx. 16 cm, white, May/June                                 |
| <b>Frugter</b>                     | orange-red, Ø 0.6 – 0.9 cm, very abundant                                   |
| <b>Torne</b>                       | ingen                                                                       |
| <b>Toksicitet</b>                  | normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr               |
| <b>Jordtype</b>                    | peaty soil, does not stand up to heavy clay or wet soils                    |
| <b>Krav til vækststedet</b>        | Tåler halvhærdning                                                          |
| <b>vinterhårdhed</b>               | 3 (-40,0 til -24,5 °C)                                                      |
| <b>Vindbestandighed</b>            | moderate                                                                    |
| <b>Øvrige modstandsdygtigheder</b> | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)                           |
| <b>Faunatræ</b>                    | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), træ med næring til fugle |
| <b>Anvendelse</b>                  | alléer og brede veje                                                        |
| <b>Form</b>                        | højstammet træ                                                              |
| <b>Oprindelse</b>                  | the northeast of North America                                              |

I sit naturlige vækstområde i det nordøstlige Nordamerika bliver denne art til et lille til mellemstort træ. Det er et langsomtvoksende træ med en lysegrå stamme og skinnende rødbrune kviste. Det gør træet til et slående syn om vinteren. Det uligefinnede blad består af 13-17 lancetformede blade, som bliver gyldengule om efteråret. Bladkanten er normalt skarpt savtakket. Blomsterstanden består af klaser på ca. 16 cm i diameter. De enkelte blomster er 0,5-0,7 cm store og hvide. Om efteråret følger orangerøde bær. S. americana ligner meget S. aucuparia, men det er de rødbrune kviste og de noget smallere mørkegrønne blade, der adskiller den.