



Sorbus commixta



Højde	8 - 10 m
Bredde	6-8m
Trækron	broad oval, half-open crown
Bark og grene	silver-grey to greyish-brown, smooth, later with shallow grooves
Blad	imparipinnate, 15 - 20 cm, leaflets ovoid to oval, dark green, feathered leaf
Efterårsfarve	gul, rød
Blomster	white, in umbels of 9 - 15 cm in diameter, May/June/July
Frugter	glossy, orange-red to brownish-red, Ø 0.7 - 0.9 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	light clay and sandy soils, withstands dry conditions
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
Anvendelse	alléer og brede veje, smalle gader, trækasser, taghaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Northeast Asia, Japan

Dette lille østasiatiske træ ligner meget *S. aucuparia* og når en højde på 8-10 m. I en ung alder er kronens form stadig opret, men senere bliver den bredt oval. Den glatte bark er sølvgrå til gråbrun med brune linser. Unge kviste er olivengrønne og har også fremtrædende linser. *S. commixta* har ujævnt fjersnitdelte blade, der består af 5 til 6 (sjældent 7) bladpar. De enkelte blade er aflange og tandede, og bladfarven er blank, mørkegrøn og blågrøn på undersiden. Om efteråret skifter den fra gul og rød til dyb koralrød. Blomsterne kommer sent om foråret og efterfølges af skinnende orangerøde til brunrøde frugter på ca. 0,8 cm i diameter. De bliver siddende på træet indtil slutningen af oktober.