




Sorbus discolor



Højde	6 - 8 m
Bredde	3-5m
Trækro	broad ovoid, half-open crown
Bark og grene	grey, twigs bare and glossy reddish-brown
Blad	imparipinnate, approx. 18 cm, 11 - 17 leaf segments, dark green, feathered leaf
Efterårsfarve	rød
Blomster	white, in umbels of approx. 12 cm Ø, May
Frugter	almost white to creamy yellow, turning pink, Ø 0.7 - 1 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	makes few demands, stands up to poor dry soils
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Northern China
Synonymer	Sorbus pekinensis discolor

Dette lille træ har en åben krone med robuste, opretstående grene. Det danner ikke en hjertegren, hvilket gør kronens form bredt ægformet. De unge kviste er nøgne og skinnende rødbrune. De uligefinnede blade består af 11-17 småblade, der er lancetformede til aflange, og støttebladene er lange. Bladranden er savtakket, undtagen ved bladbasis, hvor den er hel. S. discolor har mørkegrønne blade, som er blågrønne på undersiden. Om efteråret bliver de intenst røde. Blomsterstanden består af løst forgrenede klaser, der er let hårede og indeholder mange hvide blomster. I sensommeren følger frugterne. De er næsten hvide til cremegule og har nogle gange et lyserødt skær. På grund af deres lyse farve står frugterne i flot kontrast til træets efterårsfarver. Stærkt anbefalet art.