



Styrax obassia



Højde	10 - 15 m
Bredde	5-8m
Trækro	broad ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	twigs reddish brown, bark grey, smooth
Blad	broad oval to round, dark green, 5 - 20 cm
Blomster	in racemes, 10 - 20 cm, white with yellow stamens, approx. 2 cm, June, fragrant flowers
Frugter	ovoid drupe, white to yellowish, hairy
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	light loamy and humic soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstanddygtigheder	modstanddygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstanddygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), træ med næring til fugle
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Japan, Korea, Northern China

Meget stor busk eller mellemstort til stort træ med en bred, ægformet til rund krone. De unge kviste er rødbrune, først behårede, senere mørkviolette og nøgne til let skællede. Barken på ældre træer er grå og glat. De store blade er næsten runde med en iøjnefaldende spids. De er mørkegrønne. De to nederste blade på hvert skud sidder næsten overfor hinanden. De resterende blade sidder spredt langs kvisten. Bladenes basis er udvidet, konkav og omslutter knoppen. Blomsterne åbner sig i juni og hænger i lange klaser. De enkelte blomster er ca. 2 cm store og hvide med gule støvdragere. De har en meget stærk og behagelig duft. Træet blomstrer normalt meget voldsomt og er derefter stærkt begunstiget af bier. Blomsterne efterfølges af hårde, ægformede, hvide til gulligt behårede stenfrugter med et mørkegrønt bæger.