




Syringa vulgaris 'Maximowicz'



Højde	4-6 m
Bredde	3-5m
Trækron	round/spherical, half-open crown
Bark og grene	flaking, brown, grey
Blad	dark green
Blomster	voilet violet, flowers in May, fragrant flowers
Frugter	brown
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil, all soil types
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, lille have
Form	højstammet træ, flerstammet træ

'Maximowicz' er en stor busk til et lille træ med en bred oval til rund krone, som med tiden bliver 4-6 m høj og bred. De unge kviste er let purpurrøde. Den gamle bark er gråbrun og skaller let af i små pletter senere i livet. De ægformede blade er mørkegrønne. Blomsterklaserne er lange og forholdsvis smalle. De enkelte blomster er ret store. Blomsterknopperne er violet-lilla. De åbnede blomster er også violet-lilla. De er halvfylde til helt fyldte, men der dannes også enkeltblomster. Kronfligene er ofte buede eller let snoede. Ydersiden af blomsterne er lysere, hvilket giver en lidt tofarvet effekt. Blomsterne åbner omkring slutningen af april og begyndelsen af maj og har en stærk og behagelig duft. Syringa vulgaris Syringa vulgaris vokser i enhver næringsrig og humusrig jord. Planten foretrækker neutral til kalkholdig jord. 'Maximowicz' er meget velegnet til brug i parker og haver. I modsætning til hvad navnet antyder, blev denne sort introduceret i 1901 af Victor Lemoine & Fils i Nancy, Frankrig. Hårdførhedszone 4.

—