




Tetradium daniellii var. hupehensis



Højde	10 - 20 m
Bredde	8-12m
Trækron	bred vifteformet, halvåben krone, lunefuld voksende
Bark og grene	grå, glat bark, kviste olivengrøn, fløjlsgråt hår
Blad	uparipinnet, med 5 - 9 bladsegmenter, mørkegrøn, 20 - 35 cm, fjerformet blad
Blomster	små hvide blomster i brede pyramideformede fjer, juni/juli, duftende blomster
Frugter	tydelig rostrate frugt, rødviolet til sort, Ø 0,8 - 1 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	godt gennemtrængelig, rig på humus, ikke for våd
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	7a (-17,7 til -15,0 °C)
Vindbestandighed	moderat
Faunatræ	værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Det centrale Kina
Synonymer	Euodia hupehensis

Hurtigtvoksende solitærtræ med en halvåben bred vifteformet krone på en kort stamme. Barken er glat og mørkegrå med linser. Kvistene er olivengrønne, fløjlsagtigt behårede og med små hvidlige linser. I løbet af det andet år bliver de gråbrune. De uligefinnede blade består af 5-9 modsatte småblade og er 20-35 cm lange. Hvert blad er ægformet med en spids spids, 5-12 cm langt og kortstillet. Oversiden af bladet er mørkegrøn, mens undersiden er lysegrøn. I brede pyramideformede klaser på 10-15 cm er der duftende hvide blomster på 0,3-0,5 cm hver. Efter blomstringen følger rødlig til sorte frugter. I lang tid var dette træ kendt som *Euodia hupehensis*, men det betragtes nu som en varietet af *T. daniellii*. *Tetradium daniellii* var. *hupehensis* er et værdifuldt træ på grund af den rige sommerblomstring og de dekorative og mørkefarvede frugter om efteråret.