



Tilia cordata 'Rancho'



Højde	10 - 15 m
Bredde	6-9m
Trækron	smal kegleformet, senere smal ægformet, halvåben krone
Bark og grene	mørkebrun, rillet stamme, unge kviste grønne, senere rødbrune
Blad	mere eller mindre runde, med hjerteformet bund, mørkegrønne, 5 til 12 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	i skærme, 5 - 10 sammen, gule til cremefarvede, skarp, juni/juli, duftende blomster
Frugter	rund-ovoid, Ø 0,5 - 0,8 cm, først fittlignende, senere nøgen
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	enhver, tåler tørre forhold
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	meget god, tåler også havvind
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, smalle gader, kubusformet
Form	højstammet træ
Oprindelse	E. H. Scanlon, Olmsted Falls, Ohio, USA, 1961

Amerikansk sort, der har stor lighed med 'Böhlje'. Danner en tæt, smal pyramideformet krone, der senere bliver smalt ægformet. 'Rancho' har en regelmæssig og diagonalt stigende grenbygning. De nederste grene står i en vinkel på 45° i forhold til den lige stamme, og de øverste grene står i en vinkel på 30°. Til sidst bliver træet ca. 6 m bredt. De mørkegrønne blade er lidt større og tykkere end artens, med en hjerteformet bladbasis og en brat spids top. Den gule efterårsfarve er slående. I forsommeren dukker de stærkt duftende blomster op i korte klaser. Det lysegrønne dækblad er lidt kortere end søjlen. Små frugter følger i sensommeren. T. cordata og kultivarer er ret ufølsomme over for bladlus. På grund af sin smalle vækstform er 'Rancho' ideel til brug på veje og gader.