



Ulmus minor



Højde	20 - 30 m, fast growing
Bredde	12-15m
Trækro	broad fan-shaped to broad oval, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	has brownish-grey grooves, flakes off in platelets, twigs brown
Blad	oval-elongated to obovate, glossy green, 5 - 10 cm
Blomster	in ver♂ dense bundles, purplish-red, March, before the leaves emerge
Frugter	winged nutlet, 1.5 - 2 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	moist and light, favours calcareous soils
Jordfugtighed	Tåler våd jord, modstandsdygtig mod kort oversvømmelse, modstandsdygtig mod længerevarende oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	very good, also tolerates sea wind
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, kubusformet, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	western Europe, north Africa, south-west Asia
Synonymer	Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris

Hurtigtvoksende højt træ med en tæt krone og en variabel vækstform fra bred vifteformet til bred oval. På de nøgne kviste dannes der af og til et korklag. Bladene er ovale-lancetformede til omvendt ægformede med den største bredde i eller over midten. Glatte og blankt grønne på oversiden, næsten nøgne på undersiden. Bladbasen dækker den ene side af bladstilken, hvilket er karakteristisk for elmeblade. Bladranden er dobbelttandet. Blomsterne sidder i meget tætte bundter på 15-30 sammen. De dukker op før bladudviklingen og er purpurrøde. De rundvingede frugter er også ofte til stede før bladudviklingen, først grønne, men senere brune. Modtageligheden for elmesyge er ret høj. Ulmus minor blev tidligere plantet i stor stil, men dyrkes nu kun i begrænset omfang.