



Quercus cerris 'Summer Veil'



Højde	5 - 6 m
Bredde	3-4m
Trækrone	broad pyramidal, semi-open crown
Bark og grene	twigs grey-brown to grey-green, felt-like, bark almost black, roughly grooved
Blad	Elongated to oval, lobes very deeply incised, green, 6 - 12cm
Blomster	long ovoid, 2.5 - 3 cm, 1 - 4 together, cupule with long, narrow recurved scales
Frugter	Tree nursery M.M. Bömer, Zundert, Netherlands, 1995
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	preferably calcareous
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til væksstedet	Tåler ikke hærdning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (winterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	kubusformet, industriområde
Form	højstammet træ
Oprindelse	Middelgrote boom met een ietwat onregelmatige breed kegelvormige tot ronde kroon. Groeit beduidend langzamer dan de soort en blijft uiteindelijk kleiner. De stam heeft minder diktegroei en de twijgen zijn relatief dun. Het meest opvallende kenmerk van 'Summer Veil' zijn de zeer diep gelobde bladeren. De bladeren zijn op veel plaatsen tot op de hoofdnerf gelobt. De puntige lobben zijn op hun beurt ook grof getand. De bladern zijn 's zomers groen, kleuren geelbruin in de herfst en blijven tot diep in de winter verdroogd in de boom hangen. Gevoelig voor bastscheuren bij vorst. De diep gelobde bladeren geven de boom een fraaie, fijne textuur. Deze cultivar ontstond als zaailing van Q. cerris en werd door Van den Berk Boomkwekerijen, Sint-Oedenrode, Nederland op de markt gebracht.

Mellemstort træ med en noget uregelmæssig, bredt konisk til rund krone. Vokser betydeligt langsommere end arteren og forbliver til sidst mindre. Stammen har mindre tykkelsesvækst, og kvistene er relativt tynde. Det mest iøjnefaldende træk ved 'Summer Veil' er de meget dybt fligede blade. Bladene er mange steder fligede ind til hovednerven. Til gengæld er de spidse flige også groft tandede. Løvet er grønt om sommeren, bliver gulbrunt om efteråret og bliver siddende på træet til langt hen på vinteren, hvor det tørrer ud. Barken er tilbøjelig til at revne i frost. De

dybt fligede blade giver træet en attraktiv, fin struktur. Denne sort stammer fra en frøplante af *Q. cerris* og blev markedsført af Van den Berk Nurseries, Sint-Oedenrode, Holland.